

Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1996 à l'automne 1997

Rapport de la Centrale ornithologique valaisanne

par Emmanuel Revaz¹

ZUSAMMENFASSUNG

Ornithologische Chronik für das Wallis von Winter 1996-1997 bis Herbst 1997

Die folgende Zusammenstellung wurde auf der Basis von rund 6700 Meldungen von Beobachterinnen und Beobachtern aus dem Wallis und von anderswo realisiert; ein herzlicher Dank an alle, die mit ihren Beobachtungen zu dieser "Chronique" beigetragen haben. Wir danken auch für diejenigen Beobachtungen, die schliesslich hier nicht aufgenommen werden konnten! Unser Dank geht auch an Bernard Volet und Hans Schmid von der Schweizerischen Vogelwarte, an Claire und André Didelot-Vicari und Thierry Schmid von der Centrale ornithologique romande von Nos Oiseaux für alle Datentransfers, an Jean-Claude Praz und Anita Praz für ihre Geduld und ihr Verständnis und an Jérôme Fournier für die Illustrationen.

Wir möchten Bertrand Posse unsere grosse Dankbarkeit ausdrücken, denn er hat diese Zusammenstellung sorgfältig durchgelesen und korrigiert. Dank seiner Freundschaft, seine Kompetenz, seiner Erfahrung und seiner totalen Verfügbarkeit war es möglich, eine reibungslose Stabübergabe vorzunehmen.

Diese "Chronique" möchten wir République 5 widmen, diesem Bartgeier-Weibchen, das im Winter immer wieder im Tal von Derborence herumgeisterte, das schon fast mystische Kraft auf viele von ausübte und das durch die Schüsse eines Wilderers am 4. November 1997 umkam.



¹ Borette 12, 1890 Saint-Maurice

INTRODUCTION

La langue et les mots évoluent, et les noms d'oiseaux n'échappent pas à la règle; la nomenclature utilisée dans la présente chronique s'aligne donc sur celle proposée par la «Liste des oiseaux du Paléarctique occidental» (publiée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux en 1996) et adoptée par la Station ornithologique suisse, *Nos Oiseaux* et la Commission de l'avifaune suisse. Ainsi, que l'on se rassure: la Gallinule poule-d'eau, le Tarier pâle, le Monticole de roche ou encore le Bec-croisé des sapins ne sont pas autant d'espèces inédites observées en Valais en 1997!

La synthèse qui suit a été élaborée à partir d'environ 6700 données en provenance d'observateurs du Valais et d'ailleurs; que tous reçoivent ici un chaleureux merci pour leurs observations qui ont toutes contribué à alimenter cette chronique, même celles qui n'y figurent pas de manière concrète.

Notre gratitude va également à Bernard Volet et Hans Schmid de la Station ornithologique suisse ainsi qu'à Claire et André Didelot-Vicari et Thierry Schmid de la Centrale ornithologique romande de *Nos Oiseaux* pour tous les échanges d'informations effectués, à Jean-Claude Praz et Anita Praz pour leur patience et leur compréhension, à Jérôme Fournier pour les illustrations qui jalonnent le texte, à Hans Schmid pour les traductions allemandes.

Nous tenons aussi à exprimer notre profonde reconnaissance à Bertrand Posse, qui a relu et corrigé cette synthèse, et qui, par son amitié, ses compétences, son expérience et sa totale disponibilité, a permis un passage de flambeau tout-en douceur.

Enfin, nous terminerons en dédiant cette chronique à RépubliC 5, cette femelle de Gypaète qui, à force de hanter les hivers du vallon de Derborence, s'était élevée au rang de mythe pour beaucoup d'entre nous, et qui tomba sous les balles d'un chasseur le 4 novembre 1997.

Abréviations des noms d'observateurs Abkürzungen der Beobachternamen

A: rA = R. Arlettaz - **B:** frB = F. Baumgartner; rBu = R. Burri - **C:** yCr = Y. Crettenand - **D:** joD = J. Denkiger; mD = M. Desfayes; clD = Cl. Dirac; hDu = H. Duperrex - **E:** fE = F. Estoppey - **F:** jFi = J. Fischer; jmF = J.-M. Fivat; jeF = J. Fournier - **G:** aGe = A. Gerber; mGe = M. Gerber; Gey = Cl. Geyer; tGu = T. Guillaume; joG = J. Günther - **H:** cHa = C. Haag; jHa = J. Hartmann - **I:** rIm = R. Impstef - **J:** adJ = A. Jordi; moJ = M. Julien - **K:** cK = Ch. Keim; Ker = P. Kernen - **L:** aLu = A. Lugon; rLu = R. Lugon - **M:** paM = P. Marchesi; liM = L. Maumary; bM = B. Michellod - **O:** paO = P.-A. Oggier - **P:** mPe = M. Perraudin; beP = B. Posse; Pra = Ch. Praz - **R:** eRe = E. Revaz; Rey = J. Rey; vRo = V. Roth - **S:** Sal = P. Salzgeber; alS = A. Scheurer; cyS = C. Schönbächler; eS = E. Sermet; aSi = A. Sierro; cSi = Cl. Sinz; jS = J. Strahm - **T:** mTh = M. Thélin; jCT = J.-Cl. Tièche - **V:** rV = R. Voisin; bV = B. Volet - **W:** phW = Ph. Werner - **Z:** Zur = S. Zurbriggen.

Puis: **CAvS** = Commission de l'avifaune suisse - **div obs** = divers observateurs - **HS** = Haute-Savoie.

AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE:

ad = adulte; **ch** = chanteur; **c** = couple; **f** = femelle; **imm** = immature; **ind** = individu; **juv** = juvénile; **m** = mâle; **max** = maximum; **min** = minimum; **subad** = subadulte; **ssp** = sous-espèce.

L'HIVER 1996/97 • WINTER 1996/97

L'hiver, avec notamment des chutes de neige jusqu'en plaine à fin novembre et fin décembre, fut rude pour la majorité des **PASSEREAUX**; et si d'importantes troupes de ceux-ci se rencontrèrent parfois çà et là, ce fut grâce à l'existence d'offres locales et ponctuelles en nourriture (friches, champs de tournesols, zones déneigées par les moutons...). Ainsi donc, plusieurs migrants à courte distance hivernant chaque année en Valais se firent particulièrement discrets: Accenteur mouchet, Rougequeue noir, Etourneau, divers Fringilles...

À l'échelle nationale, l'afflux général d'air polaire qui se déversa sur tout le pays à la fin de l'année ne provoqua cependant pas que des départs, mais également des arrivées parfois massives d'espèces nordiques comme l'**OIE DES MOISSONS**, le **HARLE PIETTE** ou le **GOÉLAND CENDRÉ**, et qui se répercutèrent, en ce qui concerne notre canton, au pôle lacustre de celui-ci. Notons enfin quelques originalités, telles que le probable hivernage de 2 **CHEVALIERS CULBLANCS** dans le Chablais, le séjour d'un **MILAN ROYAL** dans le Valais central et l'hivernage complet d'un **POUILLOT VÉLOCE** dans le Haut-Valais.

Der Winter brachte insbesondere Ende November und Ende Dezember Schneefälle bis in die Niederungen und war für die Mehrheit der Sperlingsvögel rauh. Und wenn sich da und dort manchmal grössere Trupps einfanden, dann dank einem kleinflächig oder kurzzeitig zur Verfügung stehendem Nahrungsangebot (Brachen, Sonnenblumenfelder oder durch Schafe schneefrei gemachte Flächen). Somit waren verschiedene, an sich jedes Jahr im Wallis überwinternde Kurzstreckenzieher ungewöhnlich unauffällig: Heckenbraunelle, Hausrotschwanz, Star, verschiedene Finkenarten... Auf nationaler Ebene erzwang die Ende Jahr über das ganze Land hereinbrechende Polarströmung nicht nur Aufbrüche, sondern brachte auch Einflüge von nordischen Arten wie **SAATGÄNSEN**, **ZWERGSÄGERN** und **STURMMÖWEN**; sie machten sich auch am untersten Ende unseres Kantons bemerkbar. Halten wir zum Schluss auch ein paar Besonderheiten fest, so die wahrscheinliche Überwinterung von 2 **WALDWASSERLÄUFERN** im Chablais, die Überwinterung eines **ROTMILANS** im Mittelwallis und die geglückte Überwinterung eines **ZILPZALPS** im Oberwallis.



Nicheur aux goûts typiquement forestiers, répandu dans toute la taïga d'Eurasie, le Chevalier cul blanc se rencontre habituellement chez nous de passage, dans de petits milieux humides; les populations européennes hivernent dans une vaste zone, qui s'étend de l'Europe moyenne jusqu'aux régions tropicales d'Afrique. — AQUARELLE JÉRÔME FOURNIER.

GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER

Hivernage probablement complet à Grône, où l'on note 12 ind le 12.12 (paM) puis 1 à 7 ind du 3.1 au 22.2 (paM, mPe, Rey). Ailleurs, 8 ind le 12.1 à Saillon (beP) et un le 24.1 à Sierre (Rey).

GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER

A l'inverse de l'année précédente, très grande discrétion et pas d'hivernage réel, mais seulement le séjour de 2 ind à Granges/Sierre du 29.12 au 11.1 (mPe, aSi).

GRAND CORMORAN, KORMORAN

Première intrusion hivernale le 14.12 à St-Maurice (1 ind; eRe); suivent 11 ind le 16.12 à Grône (Rey). Granges/Sierre détient le quasi-monopole des effectifs valaisans hivernants, avec des observations concentrées sur un seul mois, entre le 29.12 et le 29.1 (mPe, Rey, aSi), max de 43 ind le 11.1 (mPe). Toujours en janvier, individus observés en 5 autres localités; à noter 26 ind probablement en provenance du Léman le 5.1 à Massongex (rV), et 3 observations confirmant la progression de l'espèce dans le Haut-Valais: 1 ind le 29.12 à Baltschieder (Ker), 3 le 8.1 à Viège et 10 le 12.1 au même endroit (Zur). Seule mention pour le mois de février: 1 ind les 7 et 10.2 à Grône (Rey).

HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER

Nombreuses données. Hivernage constant de 1 à 11 ind à Grône à partir du 12.12 et jusqu'à l'apport de migrateurs à la fin février (paM, Rey). Mentions d'ind hivernants ou erratiques en 8 autres localités (div obs); retenons 16 ind le 29.12 à Rarogne (Ker), contingent maximal pour l'hiver.

CYGNE TUBERCULÉ, HÖCKERSCHWAN

Séjour – désormais habituel – d'un groupe de 13 à 29 ind dans les champs inondés de Vouvry, du 27.11 au 11.1 (beP, rV). A Collombey-Muraz, 34 puis 36 ind stationnent dans un champ du 4 au 9.2 (rV).

OIE DES MOISSONS, SAATGANS

Le 11.1, 1 ind survole l'embouchure du Rhône au Bouveret en direction de la basse plaine du Rhône (jmF).

CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE

Au moins 3 ind, faisant probablement partie des derniers migrateurs, sont observés à Grône le 3.1 (Rey); ils n'y séjourneront pas.

SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

A Grône, importants effectifs d'hivernants présents à partir du 12.12 (paM, mPe, beP, Rey, aSi), atteignant un max de 41 ind le 11.1 (mPe). Autres mentions: à Vouvry, le 1.12, 1 m se nourrit dans les champs au milieu des Cygnes (jmF, beP); à Martigny, 4 ind observés sur un canal les 12 et 19.1 (beP) puis 7 ind le 9.2 traduisent le premier long séjour hivernal pour la région (beP, eRe); à Sierre, 1 ind le 8.2 (Rey).

CANARD COLVERT, STOCKENTE

A relever 35 ind le 1.12 à Martigny (beP), 80 le 12.12 à Grône (paM) et 73 le 5.1 à Granges/Sierre (mPe).

CANARD SOUCHET, LÖFFELENT

Une f le 11.1 à Grône, n'y sera plus observée par la suite (mPe).

FULIGULE MILOUIN, TAFELENT

Hivernage complet à Gêronde/Sierre de 1 à 3 m signalés dès le 19.11 et jusqu'au 19.2 (paM, mPe, Rey); sinon, observations ponctuelles de 1-2 ind à Grône et Granges/Sierre (paM, mPe, Rey).

HARLE PIETTE, ZWERGSGÄGER

6 ind (4m et 2f) le 3.2 sur le Rhône au Bouveret (jmF).

HARLE BIÈVRE, GÄNSESÄGER

Observation insolite de 4 ind le 5.1 à Rarogne (Sal).

MILAN ROYAL, ROTMILAN

Séjour hivernal d'un ind observé le 31.12 à Saxon (rLu), le 10.1 à Riddes et le 18.1 à Nendaz (yCr).

Gypaète barbu, Bartgeier

Républic 5 (HS 1993) est rejoint à Aven/Conthey par République 8 (HS 1996) du 12.2 (paO) au 13.4 (A. Chappex, H. Dessimoz) et par République 9 (HS 1996) du 28.2 (H. Dessimoz) au 10.4, jour où les 3 ind sont vus ensemble (paO). Le subad/ad qui s'était cantonné sur les hauts de Salquenen-Montana au cours de l'automne 96 (cf précédente chronique) est revu dans la même région à partir du 4.3 (D. Friedli) et jusqu'au 31.3 (P. Feldmann); un autre

ind, peut-être Mauriz (Engadine 96), est signalé sur Salquenen le 8.3 (C. Bachmann). Enfin, observations d'ind non identifiés le 7.4 à Bagnes (W. Filliez) et le 21.4 à La Fouly/Orsières (frB).

BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE

Hivernants isolés signalés entre le 1.12 et le 24.2 à Vouvry, Collombey-Muraz, Monthey, Collonges-Dorénaz, Martigny, Fully, Riddes-Saillon, Grône et Loèche.

BUSE VARIABLE, MÄUSEBUSSARD

Fortes concentrations enregistrées dans le Chablais avec notamment, à Collombey-Muraz, 11 ind sur une surface de 2500m² le 8.1 (rV).

FAUCON ÉMERILLON, MERLIN

1 à 2 hivernants entre Vouvry et Vionnaz (nJ, beP, eRe, rV) et mention d'un ind le 26.12 à Martigny (rBu).

FAUCON PÉLERIN, WANDERFALKE

Notamment un ind le 22.12 au Pas de Lovégno/St-Martin, 2600 m (Gey).

PERDRIX BARTAVELLE, STEINHUHN

Seule donnée de basse altitude, 2 ind le 11.12 à Niedergesteln, 800 m (rlm); sinon, 5 ind le 1.1 sur Evolène, 2400 m (aSi) et 4 le 22.1 sur Grengiols, 2560 m (frB).

RALE D'EAU, WASSERRALE

Aucune preuve d'hivernage complet; seuls indices de présence, des cris entendus à Grône du 17.2 au 27.2 (Rey).

GALLINULE POULE-D'EAU, TEICHHUHN

A relever 14 ind sur le canal de Saillon le 12.1 (beP); ailleurs, indices d'hivernage à Martigny, Sierre et Grône (beP, Rey; paM).

BÉCASSINE SOURDE, ZWERGSCNEPPE

Une le 12.1 à Martigny (beP).

BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE

Signalée à Martigny (une le 10.12, 9 le 12.1 et une le 9.2; G. Laurent; beP, eRe), Sion (une le 25.12; Rey) et Vionnaz (2 le 31.12; nJ).

COURLIS CENDRÉ, GROSSER BRACHVOGEL

1 le 15.12 aux Barges (beP, eRe) et 1 le 7.1 à Vionnaz (rV).

CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER

Hivernage probable à Massongex, où 2 ind sont signalés le 11.12 et le 23.1 (rV). (Illustration p. 43).

CHEVALIER GUINETTE, FLUSSUFERLÄUFER

2 observations hivernales: 1 ind le 29.1 à Monthey (paM) et un le 2.3 à Loèche (rlm).

MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE

1 ind à Sierre le 16.12 et le 3.1 (Rey) et 5 ind à Viège le 2.1 (Ker).

GOÉLAND CENDRÉ, STURMMÖWE

Présent à partir de la deuxième décennie de décembre et jusqu'à la première de janvier entre Vouvry et Collombey-Muraz (max de 17 ind le 30.12; eS).

EFFRAIE, SCHLEIEREULE

Des plumes trouvées dans le Chablais vaudois, au pied d'une paroi à Grand-duc (paM), attestent de la prédation de ce dernier sur un rapace nocturne devenu bien rare dans la plaine du Rhône...

MARTIN-PÊCHEUR, EISVOGEL

Indices d'hivernage sur le Trient à Vernayaz (beP), à Fully (B. Murisier, aSi), à Grône (Rey) et à Granges/Sierre (N. Delèze, Rey, Zur).

ALOUETTE DES CHAMPS, FELDIERCHE

Bien faible présence: 10 ind le 1.12 à Martigny (beP) et 60 le 7.1 à Vionnaz (rV).

PIPIT FARLOUSE, WIESENPIEPER

Mentionné le 1.12 à Martigny (beP), le 11.12 à Rarogne (rlm), le 15.12 à Vouvry (beP), le 27.12 à Viège (Ker) et le 19.1 à Grimsuat (aLu).

PIPIT SPIONCELLE, WASSERPIEPER

A noter 26 ind le 3.1 à Vionnaz, qui tirent profit de la présence des troupeaux de moutons piétinant la neige et dégageant le sol, procurant ainsi aux oiseaux un accès plus aisé à la nourriture (eS).

BERGERONNETTE GRISE, BACHSTELZE

Hormis un grand groupe de 30 ind le 28.12 à Vionnaz que l'on retrouve dans les mêmes circonstances que celles décrites pour l'espèce précédente (eS), l'hivernage semble bien timide; environ 10 ind le 1.12 à Vouvry et 3 le même jour à Martigny, où des isolés sont encore vus le 15.12 et le 12.1 (beP).

ACCENTEUR MOUCHET, HECKENBRAUNELLE

Discrétion encore plus marquée que pour l'espèce précédente: une seule mention, celle d'un ind le 9.2 à Martigny (beP).

ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE

27 observations, dont seulement 5 en dessous de 1000 m: 6 ind le 11.12 à Niedergesteln, 800 m (rlm), 3 le 26.12 à Feschel, 900 m (jFi), un le 29.12 à St-Léonard, 600 m (aSi), 2 le 1.1 à Batschieder, 680 m (Ker) et 2 le 16.1 à Loèche, 900 m (Rey). Mention la plus élevée: 1 ind le 22.2 sur Evolène, 2920 m (jCT).

ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ

Hivernants isolés signalés à Ardon (rLu, beP, aSi), dans la région sierroise (Rey) et Salquenen (Rey), ainsi que 2 ind à Ayent (S. Morand), l'hivernage de ces derniers ayant été suivi durant tout l'hiver de façon continue.

TARIER PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN

2 observations ponctuelles d'ind apparement en mouvement: un le 15.12 à Martigny (beP) et un le 19.1 à Tourtemagne (Sal)

MERLE NOIR, AMSEL

A noter un attroupement hivernal de 60 ind le 3.1 à Collombey-Muraz (eS).

GRIVE LITORNE, WACHOLDERDROSSEL

Grands rassemblements à Ardon (150 ind le 8.12; beP) et Vionnaz (200 ind le 15.1; rV).

GRIVE MAUVIS, ROTDROSSEL

Une seule observation, 1 ind le 8.12 à Ardon (beP).

FAUVETTE À TÊTE NOIRE, MÖNCHSGRASMÜCKE

Alarme le 9.2 à Fully (beP, eRe).

POUILLOT VÉLOCE, ZILPZALP

Un hivernant à Viège, vu du 23.11 au 16.2 (mGe, Ker, Sal, Zur).

TICHODROME, MAUERLÄUFER

Le 24.11 à Ardon (beP, Pra), seule mention au pied du coteau.

PIE-GRÎCHE GRISE, RAUBWÜRGER

Vue à Vionnaz du 21.12 au 21.1 (rV) ainsi qu'à Loèche le 24.2 et le 2.3 (rlm, Zur).

CHOCARD, ALPENDOHL

473 ind comptés à Rarogne le 11.12 (rlm).

CRABE, ALPENKRÄHE

Observé à basse altitude à Ardon, 800 m (2 ind le 24.11; beP, Pra), Loèche, 620 m (2 ind le 2.3; rlm), Feschel, 900 m (2 ind le 26.12; rBu, jFi), Niedergesteln, 800 m (le 11.12; rlm) et Rarogne, 770 m (5 ind le 16.2; rlm).

CHOUCAS, DOHLE

Hivernage complet dans la plaine chablaisienne entre Collombey-Muraz et Vouvy du 1.12 au 2.2 (fE, beP, rV), avec un max de 60 ind le 6.1 (rV). Ailleurs, 35 ind à Massongex le 19.1 (eRe).

CORNEILLE MANTELÉE, NEBELKRÄHE

1-2 ind remarqués dans la région sierroise entre le 7.12 et le 23.2 (mPe, Rey), 1 à Viège le 16.2 (mGe) et 1 à Vouvy le 1.2 (eRe).

GRAND CORBEAU, KOLKRABE

Notamment un groupe de 90 ind le 4.1 sur les hauts de Monthey (rV).

ETOURNEAU, STAR

Absence presque totale, hormis le 1.12 à Vouvy et le 15.12 à Vionnaz (beP).

NIVEROLLE, SCHNEEFINK

Plus grand groupe observé, celui de 50 ind le 22.1 à Val-d'Illiez, 1660 m (O. Jean-Petit-Matile).

PINSON DU NORD, BERGFINK

150 ind le 1.12 à Martigny (beP), puis 2 ind dans la région sierroise le 17.12 et le 22.1 (Rey).

SERIN, GIRLITZ

10 le 30.11 à Rarogne par 70cm de neige (rlm), 1 le 1.12 à Martigny (beP) et 2 le 26.12 à Fully (liM).

VENTURON, ZITRONENGIRLITZ

Notamment 15 ind le 12.12 à Sierre (paM) et 30 le 29.12 à St-Léonard (aSi).

VERDIER, GRÜNFINK

L'espèce est vue, comme l'année précédente, à fin décembre dans le val d'Hérens: 34 ind le 29.12 à Mase, 1500 m (Gey).

CHARDONNET, DISTELFINK

Le 1.12, 350 ind se nourrissent dans un champ de tournesols, à Martigny; ils sont encore 170 le 15.12 (beP). Mis à part cet attroupement dû à une offre spécifique en nourriture, les effectifs hivernants se concentrent essentiellement en Valais central, entre Ardon et Loèche (Rey, aSi), ainsi que dans le Haut-Valais, entre Ausserberg et Viège (mGe, Ker), où nous notons 40 ind le 16.2 (mGe), de loin le groupe le plus important de l'hiver; en dehors de ces zones, retenons l'hivernage de 2-6 ind à Monthey (rV). Sur l'ensemble du canton, 17 mentions en décembre, 20 en janvier et 10 en février.

LINOTTE, HÄNFLING

Hivernage bien modeste; 4-5 ind vus les 8.12 et 22.1 dans la région sierroise (Rey), ainsi que 6 ind à Martigny le 9.2 (beP).

SIZERIN, BIRKENZEISIG

En plaine, 5 ind le 8.12 à Ardon (beP) et une quinzaine à Sierre le 8.1 (Rey).

GROSBEK, KERNBEISSER

Hivernage complet de 1-2 ind dans la région sierroise, du 2.12 au 8.3 (Rey), séjours également de 2 ind à Monthey, du 6.12 au 28.1 (rV), et de 1-2 ind à Vex, du 21.12 au 2.1 (Gey); ailleurs, données plus ponctuelles: à Ardon (1 ind le 8.12 et 2 le 2.1; beP; rLu, aSi), à Martigny (un le 5.1; F. Steiner) et à Viège (un le 16.2; Zur).

BRAUNT JAUNE, GOLDAMMER

Parmi le peu d'observations, notons: une vingtaine à Collonges-Dorénaz du 25.11 au 9.2 en tout cas (beP, eRe) et un min de 30 ind le 15.12 à Martigny (beP).

BRAUNT ZIZI, ZAUNAMMER

Un le 11.12 à Niedergesteln (rlm) et 2 le 19.1 à Tourtemagne (Sal).

BRAUNT FOU, ZIPPAMMER

Très peu vu; seulement une petite dizaine d'observations de 1-2 ind, disséminées entre Vernayaz et Niedergesteln. A relever cependant la mention de 2 ind le 3.1 à Goppisberg, 1700 m (M. Eichenberger). Par ailleurs, les 20 ind vus à Ausserberg le 28.2 (I. Stamenic) sont probablement déjà des migrants.

BRAUNT DES ROSEAUX, ROHRAMMER

Pas de preuve d'hivernage, mais 3 mentions d'isolés en décembre: le 1.12 à Martigny, le 15.12 à Vouvy (beP) et le 16.12 à Grône (Rey).

LE PRINTEMPS ET L'ÉTÉ 1997 FRUHLJAHR UND SOMMER 1997

A un mois de février chaud et ensoleillé succéda un mois de mars au visage tout aussi clément, avec la sécheresse en plus (seulement 22% de précipitations par rapport à la moyenne). Ces conditions particulièrement favorables du début de printemps permirent aux premiers passereaux migrants, comme l'**HIRONDELLE DE ROCHERS**, la **BERGERONNETTE GRISE**, le **ROUGEQUEUE NOIR** et le **TARIER PÂTRE** de regagner nos contrées encore plus tôt que d'ordinaire. Cependant, un régime de bise s'installa sur une grande partie de l'Europe dès la dernière décennie de mars et perdura pratiquement jusqu'à la fin du mois d'avril, ce qui eut pour effet de contrarier bien des espèces d'oiseaux; le **TRAQUET MOTTEUX**, ainsi que les **FAUVETTES GRISETTE** et **BABILLARDE** nous ont notamment rejoints avec un retard substantiel. Au chapitre des spécialités, soulignons la deuxième observation valaisanne de **HÉRON GARDE-BŒUFS** et la visite d'une **GLARÉOLE À COLIER**; par ailleurs, des espèces méditerranéennes comme l'**ALOUETTE CALANDRELLE**, la

FAUVETTE PASSERINETTE et plus récemment le **TRAQUET OREILLARD**, observées de plus en plus régulièrement en Valais, sont-elles en train de répondre au réchauffement actuel du climat? La réponse est peut-être pour un avenir pas si lointain...

Einem warmen und sonnigen Februar folgte ein ebenso milder März, der zudem ungewöhnlich trocken war (nur 22 % der üblichen Niederschlagsmenge). Diese ungewöhnlich günstigen Bedingungen zum Frühjahrsbeginn ermöglichten den ersten heimziehenden Singvögeln wie der Felsenschwalbe, der Bachstelze, dem Hausrotschwanz und dem Schwarzkehlchen unsere Gegenden noch früher zu besiedeln als üblich. Doch dann stellte sich in der letzten Märzdekade in weiten Teilen Europas eine ausgeprägte, bis Ende April andauernde Bisenlage ein, was bei vielen Vogelarten eine gegenteilige Wirkung zeigte; Steinschmätzer, Dorn- und Klappergrasmücken erreichten uns mit merklicher Verspätung. Unter den Besonderheiten sind der zweite Walliser Nachweis von Kuhreihern und der Besuch einer Rotflügelbrachschwalbe zu erwähnen; ob mediterrane Arten wie die Kurzzeihenlerche, die Weissbartgrasmücke und neuerdings auch der Mittelmeersteinschmätzer, die immer häufiger im Wallis beobachtet werden, bereits Vorboten der aktuellen Klimaerwärmung sind? Die Antwort wird uns vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft gegeben werden...

GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER

Retour remarqué dès le 2.3 aux étangs de Finges (rlm), puis le 11.3 avec 4 ind à Grône (Rey); ensuite, max de 15 ind le 7.4 à Grône (mPe).

GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER

Migrateurs observés uniquement à Granges/Sierre: 1 ind les 23 et 26.3 et un le 22.4 (mPe).

GRAND CORMORAN, KORMORAN

Mouvements remarquables à Grône et Granges/Sierre dès le 15.3 (mPe) et jusqu'au 29.4 (Rey).

BLONGIOS NAIN, ZWERGREIHER

Les observations de mai et du début juin concernent toutes des sites traditionnels de nidification. Première mention: 2 ind le 4.5 à Loèche (rlm).

BIHOREAU GRIS, NACHTREIHER

15 observations de 1 à 5 ind réparties sur un mois entre le 4.5 et le 4.6, dont 11 pour Loèche (rlm et al). En-dehors du Haut-Valais, ind isolés le 9.5 à Martigny (beP), les 12 et 16.5 à Grône (mPe, aSi) et le 13.5 aux Rigoles de Vionnaz (jeF, paO, phW).

HÉRON GARDE-BOEUF, KUHEREIHER

1 ind le 10.5 à Martigny (phW), 2e observation valaisanne.

AIAGRETTE GARZETTE, SEIDENREIHER

Passage bien fourni, à l'instar des 2 années précédentes; total minimal de 22 ind, dont 10 pour les marais de Grône, observés entre le 4.4 et le 26.5. Première le 4.4 à Grône (mPe), max de 4 ind les 12 et 13.5 au même endroit (mPe, Rey). En dehors de Poutafontana, l'espèce est également mentionnée le 8.5 à Fully (beP) et à Baltschieder (2 ind; Ker), les 9 et 10.5 à Martigny (beP, eRe, bV), le 11.5 à Gampel (M. Frey), les 12 et 18.5 à Châteauneuf (mPe) et Loèche (Rey; M. Frey), le 15.5 à Collombey-Muraz (rV), les 24,25 et 26.5 à Loèche (A. Bassin et al).

HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER

Grand nombre de migrateurs et d'erratiques. Max de 15 ind le 23.3 à Grône (beP). Observations de montagne: 1 ind le 5.4 à Bagnes, 820m (mPe), 2 le 5.4 et le 4.5 à Champex, 1470m (mPe; bV) et un le 30.4 à Montana, 1420m (aSi).

HÉRON POURPRÉ, PURPUREIHER

Au total, 10 ind font halte en 4 localités, du 10.4 à Grône (Rey) au 11.6 à Loèche (aGe). Hormis ces 2 sites, 1 ind le 20.4 à Martigny (beP), 2 le 2.5 et un le 4.6 dans la même localité (liM; phW), et un à Sion le 24.5 (A. Eray).

CIGOGNE NOIRE, SCHWARZSTORCH

Pour cette espèce rare en migration printanière, une mention le 25.5 à Loèche (rlm).



Héron garde-boeufs observé pour la première fois au Verney le 10.05.97 – PHOTO PHILIPPE WERNER

CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH

Une très hâtive le 17.2 en migration à la hauteur de Vernayaz (eRe), puis une le 18.5 à Baltschieder (Ker) ainsi que 3 ind le 25.5 repérés à Loèche (rlm) et que l'on retrouve en vol aval de Sion à Châteauneuf (beP, Pra).

CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE

2 ind le 22.3 sur le lac à St-Gingolph (M. Spiess) et 3-11es 24-25.3 à Loèche (paM; Rey).

SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

A Grône, il est difficile de distinguer les effectifs hivernants des migrateurs; le nombre d'ind, de la mi-février jusqu'au 31.3, oscille entre 20 et 30 (mPe, beP, Rey, aSi), pour tomber brutalement à 6 le 3.4 (Rey) puis à 2 le 14.4 (mPe), dernière observation de l'espèce pour le printemps. Ailleurs, 5 ind le 24.3 à Martigny (beP) et 15 ind le même jour à Loèche (paM).

CANARD COLVERT, STOCKENTE

Retour noté le 23.2 à Martigny, avec un groupe de 22 ind (beP).

CANARD PILET, SPIESSENTE

A Grône, séjour d'un m du 21.3 au 5.4 (mPe, beP, Rey, aSi).

SARCELLE D'ÉTÉ, KNÄKENTE

Passage concentré sur une quinzaine de jours entre le 19.3 à Grône et le 2.4 à Martigny (div obs). Hormis ces 2 localités, mentions à Loèche (1 ind le 24.3; paM) et Salquenen (4 ind le 24.3; Rey).

CANARD SOUCHET, LÖFFELENTÉ

2 le 24.3 à Loèche (paM), un du 10 au 14.4 à Grône (mPe, Rey) et 2 le 21.5 à Monthey (jcT).

NETTE ROUSSE, KOLBENENTE

3 ind le 20.4 à St-Gingolph (jcT).

FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE

Uniquement à Grône, où l'on note des m isolés le 20.4 (rLu) et le 4.5 (hDu, tGu).

FULIGULE MORILLON, REIHERENTE

Une f le 1.3 à Martigny (beP).

HARLE BIÈVRE, GÄNSESÄGER

Faible passage s'échelonnant à partir du 27.2 (2 ind à Vernayaz; jeF) jusqu'au 23.5 (2 ind à Vouvy; fE); le restant des observations concerne le Rhône de St-Maurice (jeF, beP, eRe).

BONDÉE APIVORE, WESPENBUSSARD

Arrivée hâtive, avec 1 ind le 20.4 à Loèche (rlm) puis un le 24.4 à Ausserberg (aSi).

MILAN NOIR, SCHWARZMILAN

A noter 11 migrateurs en une heure le 1.4 à Gampel (rlm).

MILAN ROYAL, ROTMILAN

10 ind mentionnés entre le 2.3 à Loèche (rlm) et le 9.5 à Martigny (beP); à relever une migration de 4 ind le 8.5 entre Vionnaz et Vouvry (eRe). En outre, un ind erratique est vu un seul jour vers le 20-25.7 à Martigny (rA).

GYPAÈTE BARBU, BARTGEIER

Républic 5 réside encore dans la région de Derborence/Conthey en tout cas jusqu'au 16.8 (D. Carrard). Ses 2 compagnons de l'hiver, Républic 8 et 9, le quittent probablement dans la deuxième partie du mois d'avril, pour un très long voyage qui les conduira bien loin du massif alpin... En effet, les 2 immatures sont observés entre le 20 et le 27.5 aux Pays-Bas! Républic 9 est recueilli épuisé dans la province de Sud-Hollande puis relâché en Haute-Savoie; il est revu quelques jours plus tard, le 15.6, à Derborence/Conthey (rA), où il est encore signalé le 10.8 (M. Jaquemet). Quant à Républic 8, on est sans nouvelle de lui depuis qu'on l'a vu le 25.5 survolant les côtes de la Mer du Nord... Par ailleurs, le subad/ad de la région de Montana est repéré le 13.7 sur Varône (A. Zumstein) puis est régulièrement signalé à partir du mois de septembre; un autre ind est vu le 27.7 sur Monthey (A. Duchoud).

CIRCAÈTE, SCHLANGENADLER

Observations, ne comptabilisant jamais plus d'un ind, concentrées en 2 sites: dans la région de Loèche entre le 4.5 et le 23.6 (div obs), ainsi que dans la région de Fully-Saillon du 12.6 au 28.7 (hDu, jCT, rV). A relever, hors ces lieux traditionnels, la présence d'un ind le 30.7 à Verbier, 2200 m (rA).

BUSARD DES ROSEAUX, ROHRWEIHE

Passage abondant débutant déjà le 2.3 à Loèche (2 ind très hâtifs; rlm) et se terminant le 28.5, à Loèche (2 ind; A. Sutter).

BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE

A relever 1 ind le 2.3 à Arbaz, 1050 m (beP, aSi), un le 8.3 à Aven/Conthey, 1070 m (cID, beP, eRe), un les 21 et 22.3 à Cordona/Mollens, 1200 m (aSi), et un le 13.4 à Loèche, 1000 m (D. Friedli); en outre, une plumée de m est trouvée le 20.4 à Loèche (rlm). Dernier migrateur particulièrement tardif, le 24.5 à Loèche (vRo).

BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE

Abondance d'observations: hormis la région de Loèche, où nous avons des mentions de 1 à 3 ind du 4.5 au 28.5 (div obs), 2 ind le 26.4 à Collombey-Muraz (beP, eRe), un le 8.5 à Martigny (cID, beP) et un le même jour à Grône (jCT).

EPERVIER, SPERBER

1 ind en erratique observé le 31.7 sur Zermatt, 2940 m (joD).

AIGLE ROYAL, STEINADLER

Entre autres, une incursion en plaine: 1 ind ad poursuivi par 2 Grands Corbeaux le 3.3 à Conthey, 480 m (yCr).

BALBUZARD PÊCHEUR, FISCHADLER

1 ind le 13.4 à Loèche (mGe, rlm).

FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE

Une f imm séjourne à Branson/Fully du 4.5 au 15.5, en se nourrissant notamment des grillons du bord du canal de Fully (div obs); à Martigny, 1 ind le 8.5 (bV) et un le 19.5 (beP); dans le Haut-Valais, l'espèce est signalée à Loèche le 4.5 (1 ind; rlm), le 10.5 (1 ind; G. Kunz, M. Baumann), le 18.5 (1 m et 2 f; div obs), le 19.5 (1 f; adj), et les 24-25-26.5 (1 f; div obs), à Tourtemagne le 17.5 (1 ind; M. Frey), à Gampel le 18.5 (1 m; liM), et à Baltsch le 18.5 (1 ind; hDu). Enfin, 1 m imm en erratique estival est vu le 12.7 à Baltschieder (joG).

FAUCON ÉMERILLON, MERLIN

Le 23.2 à Martigny et le 16.3 à Vouvry (beP).

FAUCON HOBÉREAU, BAUMFALKE

Seulement 3 observations: à Loèche le 4.5 et le 25.5 (R. Aye, rlm, vRo) et à Vionnaz le 21.5 (jCT).

FAUCON PÉLERIN, WANDERFALKE

1 ind vu le 6.4 sur Zermatt, 3270 m (H. Klopfenstein).

CAILLE, WACHTEL

Premières le 27.4 à Gampel (2 ind; rlm, Sal) et à Niedergesteln (1 ind; rlm).

RÂLE D'EAU, WASSERRALLE

A noter un migrateur à Massongex les 17 et 18.3 (jeF).

MARQUETTE PONCTUÉE, TÜPFELSUMPFHUHN

1 ind à Vionnaz le 26.3 et le 1.4 (phW).

GLARÉOLE À COLLIER, ROTFLÜGELBRACHSCHWALBE

Pour la première fois à l'intérieur des Alpes: une les 18 et 19.5 dans les champs de Loèche (H.-H. Spillmann et al; CAVS).

PETIT GRAVELOT, FLUSSREGENPFEIFER

Premier les 29-30.3 à Grône (mPe), localité où l'espèce est encore observée le 10.4 (2 ind; mPe) ainsi que du 18 au 20.4 (1-2 ind; jeF, mPe, beP). Ailleurs, 1 ind à Loèche le 4.5 (rlm) et dernier migrateur le 8.5 à Baltschieder (Ker).

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

Faible passage, pas de grand groupe observé. Arrivée le 7.2 à Conthey (yCr) puis le 15.2 à Vouvry (beP, eRe). Hormis ces 2 localités, migrateurs observés à Collombey-Muraz le 19.2 (15 ind dans le lit du Rhône; eRe), à Martigny le 1.3 (eRe) et à Loèche le 2.3 et le 25.3 (rlm; Rey).

COMBATTANT, KAMPFLÄUFER

2 le 5.3 à Vouvry (eRe), puis des isolés les 2-3.4 et les 12-13.4 à Grône (mPe, Rey) ainsi que le 6.5 à Martigny (bV).

BÉCASSINE SOURDE, ZWERGSCNEPPE

3 ind sont levés le 3.3 aux Rigoles de Vionnaz (jmF).

BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE

2 premières le 9.3 à Rarogne (Sal), puis isolées à Vionnaz, Vouvry, Grône et Sion. Dernière à Vouvry le 20.4 (phW).

CHEVALIER ABOYEUR, GRÜNSCHENKEL

Un le 10.4 à Grône (mPe, Rey), seule observation de l'année.

CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER

Vu en 5 localités, du 24.3 à Finges (Rey) au 18.5 à Sion (mGe); max de 5 ind le 4.5 à Loèche (hDu, tGu).

CHEVALIER SYLVAIN, BRUCHWASSERLÄUFER

Bon passage, avec un min de 16 ind, observés du 11.4 à Grône (mPe, Rey) au 27.5 à Sion (jeF, paM). A noter 3 ind à Conthey le 10.5 (mPe).

CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSERLÄUFER

Passage relativement modeste, s'étendant entre le 12.4 à Loèche (rlm) et le 2.6 sur le Rhône de Dorénaz (beP). A relever 4 ind le 7.5 à Derborence/Conthey, 1450 m (eRe).

MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE

Faible migration; observations – le plus souvent d'ind isolés ou alors de petits groupes de 5 ind au max – dispersées entre le 2.3 à Loèche (5 ind; rlm) et le 1.6 à Grône (mPe). Aucune mention dans le Bas-Valais.

Goéland leucopée, Weisskopfmöwe:

Isolés le 8.3 à Martigny (beP), le 26.4 et le 18.5 à Grône (mPe; mGe).

GOÉLAND INDÉTERMINÉ, UNBEST. GROSSMÖWE

Un ind, très probablement leucopée, le 27.5 sur Gampel, 2000 m (cSi).

STERNE CAUGEK, BRANDSEESCHWALBE

Une le 22.6 à l'embouchure du Rhône au Bouveret (hDu, jFi, liM).

GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE

Isolées le 9.5 à Loèche (rBu, M. Ritschard, M. Schweizer) et le 18.5 à Sion (mGe).

PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE

Signalé seulement à Collonges (un le 13.4; jeF) et Martigny, où nous retenons 6 ind le 23.3 (beP) ainsi qu'un dernier migrateur bien tardif les 7 et 8.5 (bV).

TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE

Première très hâtive le 13.4 à Loèche (rlm).

PETIT-DUC, ZWERGGOHREULE

Un ind dérangé en plein jour le 24.5 à Loèche (Pra).

CHOUETTE DE TENGMALM, RAUFUSSKAUZ

Une trouvée morte à fin mai à Vétroz, 480 m! (anonyme, par aSi).



ENGOULEVENT, NACHTSCHWALBE

Un migrateur le 10.5 à Grône (Rey).

MARTINET NOIR, MAUSERSEGLER

Retour le 22.4 à Grône (Rey).

MARTINET À VENTRE BLANC, ALPENSEGLER

Premier le 8.4 à St-Léonard (mPe).

GUÉPIER, BIENEFRESSER

Un le 1.5 à Rarogne (rlm), puis des cris le 15.5 à Dorénaz (aSi) et 2 ind le 19.5 à Fully (aL par aSi).

HUPPE, WIEDEHOPF

Première particulièrement hâtive le 16.3 à Baltschieder (rlm).

TORCOL, WENDEHALS

Premier également hâtif les 20 et 23.3 à Grône (aL par aSi; mPe), puis arrivée normale le 2.4 à Martigny (4 ch; beP).

ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHNLERCHE

Une le 26.4 à Martigny (beP, J. Laesser, M. Gloor), puis, à Loèche, une les 9-10.5 (M. Schweizer, rBu, M. Ritschard, cSi) et une le 19.5 (R. Aye, adJ); toutes ces observations ont été acceptées par la CAVS.

ALOUETTE LULU, HEIDELERCHE

Retour le 23.2 déjà à Mollens (aSi).

HIRONDELLE DE RIVAGE, Uferschwalbe

Première le 5.4 à Grône (Rey). En été, apparition de l'espèce en des dates peu communes pour le Valais: un ind est vu à Loèche le 17.6 puis le 12.7 (liM; joG) et 2 sont observés à Grône le 23.6 et le 4.7 (Rey).

HIRONDELLE DE ROCHERS, Felsenschwalbe

Données très hâtives, avec 2 ind le 11.2 à Fully (O. & C. Roy) et un le 12.2 à Niedergesteln (rlm). Ensuite, signalée régulièrement à partir du 20.2 (15 ind à Vétroz; yCr). Max de 150 ind à Grône le 19.3 (mPe).

HIRONDELLE RUSTIQUE, RAUSCHSWALBE

Arrivée massive le 19.3 avec un groupe de 20 ind à Grône (mPe).

HIRONDELLE DE FENÊTRE, MEHLSCHWALBE

Dans les temps, première le 5.4 à Grône (mPe).

PIPIT ROUSSELINE, BRACHPIEPER

Migration observée entre le 20.4 et le 25.5, les 2 fois à Loèche (rlm), localité regroupant 8 des 14 observations; sinon, 3 observations à Rarogne (à noter un max de 11 ind le 9.5; liM), une à Niedergesteln le 27.4 (rlm) et 2 à Martigny les 6 et 9.5 (bV; beP).

PIPIT DES ARBRES, BAUMPIEPER

Premier tardif, le 13.4 à Loèche (rlm).

PIPIT FARLOUSE, WIESENPIEPER

Apparaît le 12.3 à Loèche (8 ind; Rey).

PIPIT À GORGE ROUSSE, ROTKEHLPIEPER

A Loèche, un le 20.4 (rlm) et 2 le 4.5 (liM).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, SCHAFSTELZE

Mouvements dès le 1.4 à Grône (mPe); max d'au moins 100 ind le 10.5 à Martigny (beP). A noter 2 m de la ssp *flavissima* le 9.5 et un le 10.5 à Martigny (beP; CAVS).

BERGERONNETTE GRISE, BACHSTELZE

Retour le 9.2 à Martigny (2 ind; beP), puis le 16.2 à Viège (mGe) et le 17.2 à Sierre (Rey).

ROSSIGNOL PHILOMÈLE, NACHTIGALL

Premier ind le 12.4 à Rarogne (rlm); premier ch le 19.4 à Grône (Rey).

GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN

Exceptionnellement précoce, le 6.3 à Martigny (B. Keist), puis normalement le 20.3 à Grône (aL par aSi) et le 20.4 à Loèche (rlm).

ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ

Un ind vu à Loèche le 21.2 (Rey) est peut-être un premier arrivant; sinon, un au même endroit le 2.3 (rlm) et un le 3.3 à Monthey (rV).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ

Arrivée le 11.4 à Sierre (Rey).

TARIER DES PRÉS, BRAUNKEHLCHEN

Un le 13.4 à Grône (Rey), de retour dans les dates normales. Par la suite, relevons un max d'une cinquantaine d'ind le 27.4 à Gampel (rlm, Sal).

TARIER PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN

Un hivernant rescapé ou un migrateur bien hâtif le 16.2 à Viège (mGe, rlm), puis isolés le 23.2 à Martigny (beP) et Sierre (Rey) ainsi que le 24.2 à Tourtemagne (Zur), le passage ne s'emballant véritablement qu'au début du mois de mars (notons une vingtaine d'ind le 2.3 à Loèche; rlm).

TRAQUET MOTTEUX, STEINSCHMÄTZER

Arrivée spécialement tardive: premiers le 12.4 à Loèche (rlm), puis 1 ind le 20.4 à Martigny (beP) et 3 le 27.4 dans la région sierroise (Rey); ce retard est probablement dû au régime de bise installé sur l'Europe durant presque tout le mois d'avril. Par ailleurs, le 9.5, une centaine d'ind au moins sont observés à Loèche (liM).

TRAQUET OREILLARD, MITTELMEERSTEINSCHMÄTZER

Observé en Valais pour la troisième année consécutive: un m le 30.4 à Gampel (A. & J. Frei; CAVS) et un le 9.5 à Loèche (liM, J.-M. Duflon; CAVS).

MERLE À PLASTRON, RINGAMSEL

Avant-coureur hâtif le 2.3 à Loèche (rlm), 1 ch le 16.3 à Anzère (P. Albrecht), puis normalement dès le 29.3 à Vouvry (fE).

GRIVE MUSICIENNE, SINGDROSSEL

Retour le 23.2 à Martigny (beP).

GRIVE MAUVIS, ROTDROSSEL

Vue le 2.3 à Loèche (3 ind; rlm), le 22.3 à Mollens, 1100 m (2 ind; aSi) et le 23.3 à Martigny (beP).

LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDSCHWIRL

11 observations concentrées entre le 27.4 à Niedergesteln (rlm) et le 11.5 à Savièse (M. Iseli). A noter 1 ch le 3.5 à Miex/Vouvry, 1460 m (beP, eRe).

PHRAGMITE DES JONCS, SCHILFROHRSÄNGER

Un le 26.4 à Grône (mPe) et 2 le 17.5 à Martigny (beP).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE, SUMPFROHRSÄNGER

Première particulièrement précoce le 24.4 à Monthey (jEf, paM).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE, TEICHROHRSÄNGER

Chante le 20.4 à Grône (beP).

HYPOLAÏS ICTÉRINE, GELBSPÖTTER

Ch le 10.5 à Grône (Rey) et le 26.5 à Loèche (cSi).

HYPOLAÏS POLYGLOTTE, ORPHEUSSPÖTTER

Une très hâtive le 20.4 à Loèche (rlm), puis régulièrement à partir du 4.5.

FAUVETTE PASSERINETTE, BARTGRASMÜCKE

Une f le 9.5 à Martigny (beP; CAVS) ainsi qu'un m ch le 18.5 à Loèche (jFi, R. Aye; CAVS).

FAUVETTE BABILLARDE, KLAPPERGRASMÜCKE

Retour extrêmement tardif, le 4.5 à Martigny (beP) et Loèche (2 ind; rlm, liM).

FAUVETTE GRISETTE, DORNGRASMÜCKE

Pour cette espèce également, le passage paraît décalé d'environ 2 semaines par rapport à la normale; premier ind noté seulement le 4.5 à Loèche (rlm), puis isolés observés le 9.5 à Martigny (beP) et Loèche (liM).

FAUVETTE À TÊTE NOIRE, MÖNCHSGRASMÜCKE

Un ind précoce le 2.3 à Loèche (rlm), puis un ch le 16.3 à Salquenen (Rey).

POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSÄNGER

Bien hâtifs, le 10.4 à Ardon (2 ind, dont 1 ch; Rey) puis le 13.4 à Lens (2 ch; aSi).

POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSÄNGER

Arrivée tardive; premier le 30.4 à Salquenen (Rey).

POUILLOT VÉLOCE, ZILPZALP

Chante le 2.3 à Loèche (rlm, Rey) et Sierre (mPe).

GOBEMOUCHE GRIS, GRAUSCHNÄPPER

Retour sur le tard, le 4.5 à Grône (aSi).

GOBEMOUCHE NOIR, TRAUSCHNÄPPER

Le 12.4 à Grône (mPe) et Loèche (rlm).

MÉSANGE BORÉALE, MÖNCHSMEISE

Un ind vu le 21.6 à l'altitude exceptionnelle de 3920 m, au Grünhorn/Fieschertal (L. Heer).

MÉSANGE NOIRE, TANNENMEISE

Toujours dans la série «spectaculaire», 4 ind observés le 8.4 sur Zermatt, 3820 m (frB).

LORIOT, PIROL

Premiers ch le 4.5 à Loèche (rlm, liM) et Tourtemagne (Rey); un arrivant tardif, le 8.6 à Martigny (beP).

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER

Une le 1.5 à Salquenen (Rey), puis le 3.5 à Miex/Vouvry, 1460 m (beP, eRe); arrivée généralisée le 4.5.

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER

2 ind dans un verger basses tiges, le 10.5 à Martigny (beP, eRe, bV).

CHOCARD, ALPENDOHL

A signaler 2 apparitions estivales en plaine: 7 ind le 3.7 à Niedergesteln (paM) et un le 14.7 à Martigny (beP).

CORBEAU FREUX, SAATKRÄHE

Une vingtaine le 2.3 à Loèche (rlm), grand groupe pour le Haut-Valais, de surcroît au printemps.

CORNEILLE MANTELÉE, NEBELKRÄHE

Isolées le 8.3 à Bramois (mPe) et le 8.4 à Ardon (paM), seules données en aval de la région sierroise.

ETOURNEAU, STAR

Retour le 15.2 à Sierre (30 ind; Rey), le 16.2 à Viège (5 ind; mGe) et le 23.2 à Martigny (30 ind; beP).

MOINEAU FRIQUET, FELDSPERLING

2 jeunes complètement mélaniques vus le 8.5 à Martigny; semblent provenir de la même couvée (cId, beP).

PINSON DU NORD, BERGFINK

Dernier tardif, le 12.4 à Loèche (rlm).

BRUANT ZIZI, ZAUNAMMER

Retour probable le 8.3 à Loèche puis le 11.3 à Conthey (Rey).

BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN

4 premiers le 26.4: 3 à Martigny et un au Bouveret (beP).

BRUANT DES ROSEAUX, ROHRAMMER

Une dizaine le 21.2 à Grône (paM) et un le 23.2 à Martigny (beP), les premiers de retour.

BRUANT PROYER, GRAUAMMER

L'observation de 2 ind le 2.3 à Loèche (rlm) constitue la seule mention pour le mois de mars; par la suite, aucune donnée en dehors de la plaine de Loèche.

INDICES DE NIDIFICATION 1997 BRUTNACHWEISE 1997

Les mauvaises conditions des mois de juin et juillet (ensoleillement modeste et passablement de pluies), bien que peu favorables à la reproduction des oiseaux et a fortiori des espèces montagnardes, n'ont semble-t-il pas empêché certains couples de **FAUVETTES À TÊTE NOIRE**, de **SERINS** et de **LINOTTES** de réaliser de véritables scores d'altitude. En outre, l'année ornithologique suisse 1997 fut marquée par une invasion générale de **CAILLES**; le Valais n'y fit pas exception, et le chant de ce gallinacé résonna bien plus fort qu'à l'accoutumée en plusieurs endroits de notre canton. Nous ne saurions terminer ce très bref survol de la saison sans mentionner les indices de plus en plus sérieux de nidification du **CORBEAU FREUX** dans le Haut-Valais ainsi que la présence inédite du **RÂLE DES GENÊTS** dans la vallée de Conches.

Die ungünstigen Bedingungen im Juni und Juli (wenig Sonne und viele Niederschläge), obwohl nachteilig für die Brutvögel und noch schwieriger für die Bergvögel, hielt einige Mönchgrasmücken-, Girtitz- und Hänfling-Paare nicht davon ab, eigentliche Höhenflüge zu produzieren. Daneben war 1997 gesamtschweizerisch ein Wachteljahr;

das Wallis machte da keine Ausnahme, und der Ruf dieses kleinen Hühnervogels erschallte an einigen Orten unseres Kantons deutlich stärker als üblich. Zu diesem sehr kurzen Überblick über die Saison ist noch der sich immer mehr erhärtende Brutverdacht bei der Saatkrähe im Oberwallis und die erstmals festgestellte Anwesenheit des Wachtelkönigs im Goms beizufügen.

GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER

Indices de nidification en 7 localités. Familles observées à Martigny (beP) et à Steg (liM), nidification certaine à Grône (4 c; Rey), possible à Loèche (rlm), Monthey (jCT), Sierre (Rey) et St-Léonard (paM).

BLONGIOS NAIN, ZWERGRIEHER

Nidification probable à Grône (mGe, mPe, Rey) et à Loèche (rlm, Rey, aSi), les deux sites traditionnels pour l'espèce.

CYGNE TUBERCULÉ, HÖCKERSCHWAN

A signaler la nidification d'un c à Vouvry (jeF, paM).

CANARD COLVERT, STOCKENTE

En plaine, nidification certaine signalée en 3 localités: Charrat (beP), Grône (jCT), et Vionnaz (rV); en montagne, familles signalées à Champex, 1470 m (bV) et Derborence, 1450 m (aSi).

FULIGULE MORILLON, REIHERENTE

Observation étonnante d'un groupe d'une cinquantaine d'ind le 22.6 à Vouvry (liM).

AUTOUR, HABICHT

A signaler en altitude le comportement de parade d'un c le 1.4 sur Mund, 2300 m (M. Eichenberger).

FAUCON HOBREAU, BAUMFALKE

Nidifications probables à Collombey-Muraz (eS) et Vouvry (fE); 1 ind observé à Loèche le 20.6 et le 13.7 (Rey; joG).

FAUCON PÉLERIN, WANDERFALKE

Signalé en 24 localités, en plaine comme en montagne.

GÉLINOTTE, HASELHUHN

Entre autres, un m chante le 8.2 à Finhaut, 1360 m (aSi).

PERDRIX BARTAVELLE, STEINHUHN

Donnée la plus basse, 1 c le 17.5 à Hohtenn, 1450 m (bV).

CAILLE, WACHTEL

Année d'invasion. De fortes densités sont notamment enregistrées dans le Haut-Valais: 14 ch entendus les 12 et 13.7 sur les communes d'Agarn et de Loèche (joG), 6-7 ch entre Gampel et Tourtemagne (div obs), un à Bratsch, 1640 m (H. Kunz), un à Niedergesteln (bV) et 2 à Rarogne (Sal); plus haut dans la vallée, 1 ind le 19.5 à Filet, 1450 m (C. Katzenmaier) et un min de 5 ch le 24.5 à Lax, 1100 m (U. Senn). Ailleurs, 3 ch à Arbaz, 1030 m (beP), un à Vouvry (liM) et un à Sion (fE, aSi), ainsi qu'un ind le 1.7 à Montana, 1120 m (phW).

RÂLE D'EAU, WASSERRALLE

Présence à Loèche (rlm), Finges (Rey), Grône (Rey, aSi, jCT) et Vionnaz (paM, jCT).

MARQUETTE PONCTUÉE, TÜPFELSUMPFUHN

Un ind trouvé mort le 28.6 à Finges, sous une ligne électrique (yCr), l'un des rares indices de présence estivale.

RÂLE DES GENÊTS, WACHTELKÖNIG

Pour la première fois dans la vallée de Conches: 1 m ch le 18.6 à Ulrichen, 1350 m (liM).

FOULQUE MACROULE, BLÄSSHUHN

5 nids comptés à Grône (jCT); ailleurs, nidification certaine à Loèche (joG, beP, aSi), Martigny (beP) et Sion (jeF, paM).

PETIT GRAVELOT, FLUSSREGENPFEIFER

7 à 8 territoires recensés sur le Rhône de Finges, ainsi qu'une nidification probable à Sion (aLu). (Illustration p. 50).

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

Après la désertion, malheureusement confirmée cette année, du site de Vionnaz, seulement 6 c possibles cantonnés à Vouvry (beP), où des juv sont observés le 22.6 (rV).





Le Petit Gravelot est un représentant typique de l'avifaune des zones alluviales pionnières.

AQUARELLE JÉRÔME FOURNIER.

BÉCASSE, WALDSCHNEPPE

Croule notée sur Monthey, Vionnaz et Collombey-Muraz (fE), ainsi qu'à Val d'Illiez (rV).

CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER

9 territoires sur le Rhône de Finges (aLu). A Martigny, tentative éphémère d'installation à début juin, rapidement interrompue par les crues du Rhône recouvrant les bancs de galets (beP).

TOURTERELLE DES BOIS, TURTeltaube

Présence mentionnée uniquement à Vouvry (fE) et Grône (Rey).

COUCOU GRIS, KUCKUCK

Mention la plus élevée: un ch du 28.6 au 5.7 sur Zermatt, 2300 m (F. Brugger).

EFFRAIE, SCHLEIEREULE

Un seul indice de reproduction: un juv trouvé mort dans un nichoir à Fully (rA).

PETIT-DUC, ZWERGohreule

Un recensement, où le risque de double comptage n'est pas exclu, est effectué le 23.5 dans le secteur de Savièse à Ayent et donne le résultat suivant: 7 ch à Arbaz et 5 ch à Ayent (aLu et al), un ch ayant été entendu la veille à Savièse (F. Udry). Ailleurs, 1 ch à Vex le 30.5 (aLu) et un le 18.6 à Münster, 1370m (liM, S. Tschanz; CAVS), insolite à cette altitude.

GRAND-DUC, UHU

4 sites dans la plaine du Rhône, dont 3 nidifications certaines (4 juv; rA, bM), ainsi que 2 mentions en montagne, dont une à plus de 2000 m; ces chiffres sont assurément sous-estimés en raison d'un effort réduit de prospection.

CHEVÉCHETTE D'EUROPE, SPERLINGSKAUZ

Signalée à Vouvry, 1510 m (fE), Ravoire, 1640 m (cLD, N. Erard, beP, eRe), Liddes, 1700 m (G. Laurent, P. Patthey), Mase, 1860 m (rLu) et Niedergesteln, où, le 28.5, un ind chantant depuis une demi-heure est soudain capturé par une Chouette de Tengmalm! (rlm).

HIBOU MOYEN-DUC, WALDOHREULE

Nidifications certaines à Loèche (div obs), Tourtemagne (joG), Zermatt, 1760 m (joD) et Martigny (rA).

ENGOULEVENT, NACHTSCHWALBE

Aucune donnée du Valais romand; ch signalés à Varône, Salquenen (H. Kunz), Loèche (div obs) et Gampel (aGe).

MARTIN-PÊCHEUR, EISVOGEL

Nidification probable à Dorénaz (beP); ailleurs, seulement des indices, avec présence estivale remarquée à Grône et Sion (mGe, mPe, Rey, jCT; jeF). (Illustration p. 51)

GUÉPIER, BIENENFRESSER

Au total, 6 c nicheurs dans le Haut-Valais (div obs).

HUPPE, WIEDEHOPF

Signalée en 11 localités du Haut-Valais et en 8 du Valais romand.

TORCOL, WENDEHALS

La grande majorité des données provient de la plaine entre Martigny et Ausserberg; relevons tout de même des ch à Evolène, 1700 m (mTh), sur Sierre, 1200 et 1900 m (bV; Rey), Feschel, 1100 m (M. Baumann) et Töbel, 1340 m (aSi), ainsi que 2 familles à Zeneggen, 1440 et 1530 m (Sal). Seulement 2 ch signalés en aval de Martigny: un le 2.5 à Monthey (paM) et un le 15.5 à Dorénaz (aSi).

PIC ÉPEICHETTE, KLEINSPECHT

Signalé à Vouvry, Dorénaz, Vernayaz, Martigny et Fully, puis en 10 localités entre Sion et Ausserberg.

PIC TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT

Tambourine le 3.5 à Miex/Vouvry (beP, eRe) et vu le 3.8 à Ravoire/Martigny-Combe (phW); par ailleurs, des traces découvertes sur des troncs indiquent peut-être sa présence à La Fouly/Osières ainsi qu'à Derborence/Conthey (L. Willenegger).

ALOUETTE LULU, HEIDELERCHE

Hormis une mention en provenance de Savièse (bM), toutes les données sont concentrées entre Sierre et Loèche.

HIRONDELLE DE ROCHERS, FELSENSCHWALBE

Une seule donnée de nidification sur un bâtiment, à Mörel (C. Walker-Bleisch). Mention la plus élevée à Zermatt, 2480 m (joD).

PIPIT DES ARBRES, BAUMPIEPER

En plaine, 1 ch le 27.4 à Steg (Sal) et 1 ind le 13.7 à Finges (joG).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, SCHAFSTELZE

Nidification certaine à Vouvry (liM, rV) et 1 couple à Collombey-Muraz le 3.6 (eS); dans le Haut-Valais, nidifications à Loèche, Tourtemagne et Gampel (div obs), ainsi qu'une mention d'un ind à Rarogne le 26.7 (hDu).

CINCLE, WASSERAMSEL



Martin-pêcheur, Eisvogel.

DESSIN JÉRÔME FOURNIER.

En plaine, nidifications certaines à Martigny (beP), Sion (paM), Salquenen (rLu, Rey) et Viège (Zur), probables à Vouvry (jcT) et Tourtemagne (joG, paM), possibles en 9 autres localités.

ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE

Indices de nidification entre 1950m (à Chandolin; dCr) et 3350 m (sur l'Unterbachhorn/Naters; jcT).

ROSSIGNOL PHILOMÈLE, NACHTIGALL

Seulement 155 chanteurs comptés entre le 13 et le 22.5 sur les berges du Rhône entre Martigny et Sierre; ce chiffre doit cependant être considéré comme un min, le comptage n'ayant correspondu qu'à un seul passage (jeF, paM).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ

Les nicheurs de plaine sont bien rares en aval de la région sierroise: ch signalés au Bouveret (beP), à Collombey-Muraz et Vernayaz (jeF), ainsi qu'une f alarmant à Grône (aSi). En altitude, une seule donnée supérieure à 2000 m: 1 ch devant une cavité le 9.7 sur Miège, 2020 m (aSi).

TARIER, BRAUNKEHLCHEN

Comme l'an dernier, la seule mention de plaine en aval de Loèche provient de Collombey-Muraz (1 ind le 5.7; rV). En montagne, dépasse les 2000 m à Evolène (notamment un ch à 2300 m; mTh), à Bovine/Martigny-Combe (beP, bV), au Simplon (M. Kappeli), à Törbel (Sal), à Lovégno/St-Martin (Gey) et à Zermatt, où 18 c sont comptés entre Zmutt et Bodmen, 2000 m environ (moJ, jS).

TARIER PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN

L'essentiel des effectifs nicheurs valaisans est comme d'habitude concentré entre Loèche et Viège. Plus bas dans le canton, 1 territoire à Vouvry (liM), 2 à Vionnaz (beP, rV, phW), 1-2 à Collombey-Muraz (eS, rV), 1 à Massongex (eS), 2 à Collonges

(eRe), 5 à Dorénaz (jeF, eRe), 8 à Martigny (beP), 2 à Ardon (beP), 4 à Sion (jeF, mGe, paM, aSi), 1 à St-Léonard (paM, aSi), et 2 à Sierre (mPe, beP, Rey, phW).

MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL

Un c présent en mai sur Dorénaz, 700m (jcT), après des années sans indices sur les coteaux du coude du Rhône.

MERLE NOIR, AMSEL

Une famille avec m ch dans une aulnaie d'altitude le 15.6 sur Martigny-Combe, 2020 m (beP).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE, SUMPFROHRSÄNGER

Notamment un c et un ch le 12.6 à Birchen/Loèche-les-Bains, 1300 m (aSi).

ROUSSEROLLE TURDOÏDE, DROSSELROHRSÄNGER

Pour la première fois, rien à signaler.

HYPOLAÏS ICTÉRINE, GELBSPÖTTER

2 ch le 22.5 sur le site sierrois occupé depuis 1994 au moins (aSi).

HYPOLAÏS POLYGLOTTE, ORPHEUSSPÖTTER

Seul indice de nidification en aval de Martigny, un c à Vouvry le 22.6 (liM).

FAUVETTE ORPHÉE, ORPHEUSGRASMÜCKE

Au moins un ind le 13.7 à Loèche (joG).

FAUVETTE GRISETTE, DORNGRASMÜCKE

A Loèche, une nidification probable (aGe, joG, rlm, liM) et une autre possible (vRo); à Martigny, un ch le 2.6 (beP) et un les 4 et 8.6 en un second site (beP, phW).

FAUVETTE À TÊTE NOIRE, MÖNCHSGRASMÜCKE

Performances d'altitude: 2 ch le 18.6 sur Gampel, 1900 m (H. Kunz), 1 ch le 12.7 à Törbel, 1750m (aSi) et 1 ch dans une lande à myrtilles et genévriers le 15.6 sur Martigny-Combe, 2200 m! (beP).

POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSÄNGER

1 ch à Dorénaz le 14.5 (jcT), mention la plus en aval de la plaine du Rhône. En altitude, retenons 1 ch à Bratsch, 2100 m (cSi), et un sur Evolène, 2090m (mTh).

POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSÄNGER

Ch isolés au Simplon, 1260 m (M. Spiess) et à Loèche-les-Bains, 1300 m (aSi), et 2-4 ch à Finges (Rey).

POUILLOT VÉLOCE, ZILPZALP

Entendu le 26.5 sur Zermatt, 2220 m (moJ, jS).

MÉSANGE À LONGUE QUEUE, SCHWANZMEISE

Observée le 26.7 à 1820 m au-dessus de Zermatt (joD), peut-être un indice d'un cantonnement élevé.

LORIOT, PIROL

Comme d'habitude, plusieurs ch entre Loèche et Gampel (div obs); plus en aval, ch isolés à Finges (beP), Sierre (Rey), Martigny (beP), Collombey-Muraz (eS) et Port-Valais (hDu), ainsi que 3 ch à Vouvry (fE, liM).

PIE-GRÈCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER

En plaine, hors Haut-Valais, le bilan paraît bien maigre; l'espèce est signalée à Collombey-Muraz (1 c; rV), Martigny (M. Baudraz, beP) et Sion (1 c; aSi). En altitude, une nidification probable à Törbel, 1900 m (Sal).

CHOCARD, ALPENDOHL

A nouveau présent en mai sur le coteau de Loèche, 800 m (rlm, A. Sutter).

CRABE, ALPENKRÄHE

Présence mentionnée sur La Fouly/Orsières, Bourg-St-Pierre, Ardon-Conthey, Evolène, Miège, Grimontz, Erschmatt, Gampel, Zermatt et Saas Almagell.

CHOUCAS, DOHLE

Probablement 2 c à St-Maurice (paM), et 5-6 ind vus les 24 et 25.5 à Loèche (A. Bassin, aGe, rlm, beP).

CORBEAU FREUX, SAATKRÄHE

1 à 4 ind vus à Loèche le 12.4, le 29.5 et le 2.6 (rlm; A. Sutter; Rey), puis 6 ind, dont 2 ad et 4 juv, repérés à Gampel le 28.6 (cId, rlm, beP); plus grand chose ne manque pour prouver définitivement la première nidification du Freux en Valais...

GRAND CORBEAU, KOLKRABE

Cris de juv entendus le 27.7 dans une falaise sur Zermatt, 3040 m (joD); la reproduction de l'espèce à cette altitude paraît cependant bien peu probable.

MOINEAU CISALPIN, ITALIENSERLING

Mentionné en période de nidification à Sion, Sierre, Loèche (Rey) et Zermatt, 1700 m (c nourrissant au nid; jS).

NIVEROLLE, SCHNEEFINK

Retenons la nidification certaine d'un c à Zermatt, 3120 m (joD).

SERIN, GIRLITZ

Les scores de l'année dernière sont battus... 1 ch le 26.7 sur Zermatt, 2120 m! (joD).

CHARDONNET, DISTELFINK

Notamment, en altitude, ch le 9.7 au-dessus de Miège, 1900 m (aSi).

TARIN DES AULNES, ERLENZEISIG

Une famille le 22.7 à Steg, 630 m (liM); en outre, l'espèce est également observée le 13.7 en 2 autres endroits de la plaine de Loèche (joG), et 1 ch est entendu le 27.5 à Gampel (cSi).

LINOTTE, HÄNFLING

Entre autres, une nidification certaine à Nendaz, 2220 m (Rey).

ROSELIN, KARMINGIMPEL

Une famille le 28.7 à Geschinen (hDu, liM), seule mention pour l'espèce.

GROSBEK, KERNBEISSER

La présence de cet oiseau bien discret est signalée à St-Maurice (jeF), Evolène, 1800m (mTh), Loèche, Niedergesteln (rlm) et Bûrchen (nidification certaine; Sal).

BRUAUT JAUNE, GOLDAMMER

Hormis la région comprise entre Loèche et Steg, aucune donnée de plaine...

BRUAUT ZIZI, ZAUNAMMER

En plaine romande, 1-2 ch à Collonges les 1 et 13.4 (eRe).

BRUAUT FOU, ZIPPAMMER

Aucune mention de nidification en aval de St-Maurice. En altitude, 4 données au-dessus de 2000m: ch le 27.5 sur Bratsch, 2120 m (cSi), les 10 et 11.7 sur St-Martin, 2100 m (Gey), le 22.7 sur Zermatt, 2000 m (joD) et le 9.8 sur Saas Almagell, 2100 m (2 ind; Sal).

BRUAUT ORTOLAN, ORTOLAN

Hors plaine Loèche-Gampel: 2 territoires à Rarogne (Sal), 1 ch à Ayent (aSi), 2 ch à Liddes (jeF) et 2 familles sur Zermatt, 1660 et 1720 m (joD).

BRUAUT PROYER, GRAUAMMER

Présent exclusivement entre Loèche et Gampel.

L'AUTOMNE 1997 • HERBST 1997

Le temps généralement beau et chaud qui régna durant la majeure partie de l'automne n'incita pas les migrants à faire escale chez nous; globalement, le passage – des Limicoles et des Passereaux notamment – fut donc assez faiblement perceptible. Quelques espèces firent cependant exception à cette discrétion générale; ce fut le cas du **BEC-CROISÉ**, qui envahit le Plateau suisse dès la fin juin, et que l'on rencontra également en plaine du Rhône. Le **CASSENOIX** effectua lui aussi des mouvements inhabituels, relativement bien démontrés au col de Bretolet. Mis à part ces phénomènes de grande ampleur, l'automne valaisan fut également animé par plusieurs événements d'intérêt majeur, parmi lesquels nous citerons le passage d'une **MOUETTE PYGMÉE**, l'escalade d'un **BÉCASSEAU COCORLI** à 2480m, ainsi que des apparitions complètement hors date, tels cette halte d'un groupe de plus de 200 **FREUX** à fin août dans le Chablais ou ce bref séjour d'une **PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR** au milieu du mois de novembre.

Das meist schöne und warme Herbstwetter, das während der meisten Zeit herrschte, bewog die meisten Zugvögel nicht dazu, bei uns zu rasen; insgesamt war der Zug – besonders bei dem Limikolen und bei den Sperlingsvögeln – recht unauffällig. Einige Arten machten allerdings eine Ausnahme; dies war etwa beim Fichtenkreuzschnabel der Fall, der ab Ende Juni das Mittelland in Scharen aufsuchte und den man auch in der Rhoneebene antraf. Auch der Tannenhäher zeigte ungewöhnlich starke Bewegungen, recht gut auf dem Col de Bretolet nachweisbar. Neben diesen grossflächig feststellbaren Phänomenen wurde der Walliser Herbst auch von ein paar speziellen Ereignissen belebt. Zu erwähnen sind das Auftreten einer Zwergmöwe, die Rast eines Sichelstrandläufers auf 2480 m sowie Erscheinungen völlig ausserhalb der "Saison", so der Aufenthalt von 200 Saatkrähen Ende August im Chablais oder die kurze Rast eines Neuntöters erst Mitte November.

GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER

Max de 21 ind le 17.10 à Grône (mPe).

GRAND CORMORAN, KORMORAN

Premiers notés le 19.7 (date hâtive!) et le 28.7 à Grône (Rey); en août, 7 observations de 1-3 ind, toutes à Grône (Rey, jCT). A Monthey, rV comptabilise, entre le 10.9. et le 15.12, 5243 ind en provenance des Grangettes et en route vers le sud; max journaliers atteints le 28.9 (494 ind) et le 25.10 (483 ind). Les apparitions de plaine ne se généralisent véritablement qu'à partir du mois de novembre; notons 20 ind le 13.11 à Granges/Sierre (Rey) et 19 ind le 15.11 à Loèche (beP).

BLONGIOS NAIN, ZWERGRIEHER

Migrateurs isolés observés à Sierre le 23.8 (paM) et à Grône le 19.9 (Rey).

HÉRON GARDE-BOEUF, KUHREIHER

1 ind vu un seul jour vers le 20-25.7 à Martigny (rA): deuxième mention de l'année!

HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER

En montagne, 1 ind le 2.9 à Montana, 1420 m (aSi).

CIGOGNE NOIRE, SCHWARZSTORCH

2 observations de l'espèce en migration de montagne: 1 ind passe le col de Bretolet le 25.9 (jHa) et 1 ind est repéré le 18.10 sur Ravoire/Martigny-Combe, puis survolant l'Arpille en direction de Trient (J. Bochatay).

CYGNE TUBERCULÉ, HÖCKERSCHWAN

A Grône, 3 ind sont signalés le 30.8 puis 2 les 25 et 29.10 (jCT; mPe, Rey); l'ind solitaire depuis 1989 aurait-il enfin retrouvé l'âme sœur? A Collonges, 1 ind séjourne sur le Rhône à partir du 13.10 et jusqu'au 7.12 en tout cas (beP, eRe).

CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE

Un ind fait halte durant 3 jours à Grône, du 29.9 au 2.10 (mPe), un autre durant une dizaine de jours à Martigny, du 30.10 au 8.11 (cLD, beP).

CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE

2 ind le 25.10 à Grône puis 3 le 29.10 au même lieu (Rey; mPe).

SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

A Grône, observations de 1 à 26 ind du 30.8 au 13.11 (mPe, Rey, jCT). A noter également 3 ind aux Rigoles de Vionnaz, du 12 au 15.10 (beP, eRe), ainsi que des individus isolés à Martigny le 13.11 et à Loèche le 15.11 (beP).

CANARD COLVERT, STOCKENTE

Max de 195 ind le 29.9 à Grône (mPe).



Bienvenue de la
Printemps

SARCELLE D'ÉTÉ, KNÄKENTE


Une seule observation, 1 ind le 26.8 à Loèche (W. Steenge); ce bien maigre bilan s'inscrit parfaitement dans la tendance nationale.

NETTE ROUSSE, KOLBENENTE

1 m séjourne à Grône du 26.8 au 2.10 (mPe, Rey, jCT); peut-être est-ce le même ind qui établit ses quartiers à Sierre entre le 14.10 et le 30.11 (Rey).

FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE

1 m les 16 et 17.10 à Grône (mPe, Rey), un le 8.11 au même endroit (mPe) et 2 ind le 16.11 à Baltschieder (Sal).



Cassenoi moucheté, Tannenhäher.

DESSIN JÉRÔME FOURNIER

BONDÉE APIVORE, WESPENBUSSARD

Au col de Bretolet, première migratrice le 16.8, max de 79 ind le 14.9 (jHa) – plus du quart du total de l'automne pour l'espèce! –, dernière tardive le 25.10 (rlm, cyS).

MILAN NOIR, SCHWARZMILAN

Dernier migrateur le 20.9 au col de Bretolet (jHa, nJ).

MILAN ROYAL, ROTMILAN

Un premier migrateur franchit le col de Balme le 18.9 (eRe), seule mention hors col de Bretolet, où la dernière observation date du 25.10 (4 ind; rlm, cyS).

GYPAÈTE BARBU, BARTGEIER

Un ind est vu les 9, 28 et 29.9 sur Champéry (D. Crausaz; cyS; jCT) et République 9 s'installe à Derborence/Conthey à partir du 26.10 (V. Chabloz, L. Willenegger); l'ind subad de la région de Montana-Varone – peut-être Argentera, rebaptisé Trubel – est rejoint le 21.9 par République 5, f subad (rA)... Mais le 4.11, date noire pour tous les ornithologues du Valais et d'ailleurs, cette dernière est froidement abattue par un chasseur à Cry d'Er sur Crans-Montana.

CIRCAÈTE, SCHLANGENADLER

Un ind survole le col de Bretolet le 3.9 (jHa).

BUSARD DES ROSEAUX, ROHRWEIHE

1 ind le 30.8 à Grône (jCT), seule observation de plaine. En montagne, ind isolés le 6.9 à Bürchen, 2200 m (P. Wiprächtiger) et le 8.9 dans la région du Sanetsch/Savièse, 2400 m (jCT); le 14.9, 11 ind franchissent le col de Balme (cLD, rLu, beP, eRe, aSi) et 38 (max pour l'automne) passent le col de Bretolet (jHa).

BUSARD SAINT-MARTIN, KORNEWIHE

Au col de Bretolet, max de 4 ind le 25.10, pour un total automnal de 13 ind (cyS). En plaine, 1 ind le 14.11 à Loèche (Rey) et présence de 1-2 ind dans la région de Vouvry-Vionnaz à partir du 16.11 (nJ, beP, eRe, rV).

BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE

1 ind le 9.8 à Monthey (rV). Au col de Bretolet, 6 migrants isolés du 2 au 16.9 (cHa et al), ce qui correspond à un fort passage.

EPERVIER, SPERBER

Au col de Bretolet, forte migration le 25.10 avec 42 ind (cyS).

BUSE VARIABLE, MÄUSEBUSSARD

Le passage le plus intense sur le col de Bretolet est également enregistré le 25.10 avec 40 ind (cyS).

BALBUZARD PÊCHEUR, FISCHADLER

Au col de Bretolet uniquement, où 20 ind sont mentionnés du 29.8 au 25.10 (date très tardive), avec un max de 4 le 21.9 (J. Gremaud, cHa).

FAUCON ÉMERILLON, MERLIN

Premier migrateur le 25.9 à Bretolet (jHa), puis une observation de plaine le 28.9 à Vouvry (rV). Les observations de Vouvry, Vionnaz et Collombey-Muraz et datant des deuxième et troisième décades de novembre (nJ, beP, eRe) concernent soit d'ultimes migrants, soit des ind en passe d'hiverner.

FAUCON HOBREAU, BAUMFALKE

Seule observation de plaine, 1 ind le 11.9 à Granges/Sierre (mPe). A Bretolet, passage du 8.9 au 4.10, avec un max de 10 ind le 21.9 (cyS).

FAUCON PÉLERIN, WANDERFALKE

Au col de Bretolet, migration observée du 6.8 au 26.10.

CAILLE, WACHTEL

2 dernières migratrices levées le 18.10 sur l'arête de Berroi/Champéry, 1850 m (L. Fischer).

RÂLE D'EAU, WASSERRALLE

Entendu à Grône jusqu'au 16.11 (Rey).

RÂLE DES GENÊTS, WACHTELKÖNIG

Un oiseau est capturé le 18.9 au col de Bretolet (cyS).

GALLINULE POULE-D'EAU, TEICHHUHN

A noter 14 ind le 2.10 à Grône (mPe), et 8 ind (peut-être encore une famille) le 2.11 sur le Rhône de Collonges (eRe).

FOULQUE MACROULE, BLÄSSHUHN

151 ind sont dénombrés à Grône le 2.10 (mPe).

GRUE CENDRÉE, KRANICH

Une première pour Bretolet, 15 oiseaux franchissent le col le 25.10 (rlm, cyS).

PLUVIER GUIGNARD, MORNELLREGENPFEIFER

Un le 22.8 près du col du Grand-St-Bernard, 2900 m (yCr), et un le 14.9 au col de Bretolet (cHa, Pra, cyS), encore une première pour l'endroit.

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

Mentionné à Conthey (2 ind les 22-23.10; yCr), à Martigny (notons 40 ind le 23.10; cLD, beP), et Vouvry (22 le 19.11; rV).

BÉCASSEAU COCORLI, SICHELSTRANDLÄUFER

Deuxième observation valaisanne: 1 juv rencontré le 31.8 dans le décor très nordique du haut val de Réchy, 2480 m! (aLu).

BÉCASSEAU VARIABLE, ALPENSTRANDLÄUFER

Un le 7.8 au BAC de St-Léonard (mD) et un le 12.10 dans un champ à Vouvry (beP, eRe).

BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE

Une migratrice le 18.9 au col de Bretolet (cHa), puis vue à 6 reprises à Grône et Martigny (mPe; beP, pHW).

BÉCASSE, WALDSCHNEPPE

Une capturée à Bretolet le 20.10 (L. Cunningham) et 2 ind vus à Riddes le 8.11 (yCr).

COURLIS CENDRÉ, GROSSER BRACHVOGEL

Un bien hâtif le 3.7 à Vouvry (rV) et un ind (venant de France!) qui franchit le col de Bretolet le 26.8 (cHa, cyS).

CHEVALIER GAMBETTE, ROTSCHENKEL

Un ind passe le col de Bretolet le 19.10 (rlm).

CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER

Passage très discret, certainement dû à la météo trop belle du mois d'août qui aura décidé la majeure partie des oiseaux à poursuivre leur route sans halte; 1 ind le 28.7 à Grône (Rey), puis, à Martigny, 1 ind le 22.8 et 3 le 29.8 (hDu, J. Duplain; beP).

CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER

En plaine, total de 10 ind observés à Grône, Martigny et Rarogne entre le 8.8 (Rey) et le 24.9 (paM). Au col de Bretolet, une quinzaine d'ind signalés entre le 28.8 (cHa, cyS) et le 27.9 (A. Barbalat).



116 • 1998
Page 54

LABBE À LONGUE QUEUE, FALKENRAUBMÖWE

Un ind vu au col de Bretolet le 29.8 (cyS, cHa, B. Gimelli; CAVS).

MOUETTE PYGMÉE, ZWERGMÖWE

Une parmi des Mouettes rieuses le 28.8 à Rarogne (paM).

MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE

Mouvements notés du 28.6 à Grône (Rey) au 18.10 à Sion (mPe). A relever le séjour d'un ind du 28.6 au 5.7 à Täsch, 1450 m (F. Brugger), ainsi que de grands groupes signalés dès la dernière décade d'août dans le Chablais, principalement à Vouvry-Vionnaz: 300 ind le 31.8, 250 les 10 et 16.9, 400 le 26.10 (rV).

GOÉLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÖWE

A Vouvry-Vionnaz-Collombey-Muraz, signalé régulièrement du 24.7 au 2.11, avec un max de 107 ind le 10.8 (rV); En dehors du Chablais, 2 ind le 16.7 à Vernayaz (aSi) et 2 le 26.7 à Niedergesteln (hDu).

GOÉLAND MARIN, MANTELMÖWE

Observation très insolite de 2 ad le 11.9 au col de Bretolet (jHa).

GUIFETTE NOIRE, TRAUSERSEESCHWALBE

Une juv les 30 et 31.8 à Grône (Rey, jCT).

PIGEON BISET DOMESTIQUE, STRASSENTAUBE

Un ind le 26.9 sur Zermatt, 2560 m, perché sur le toit d'une gare de téléphérique (moJ, jS).

PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE

Notamment 12 ind le 11.10 à Collombey-Muraz (rV).

TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE

Unique observation, une le 27.8 à Sierre (paM).

ENGOULEVENT, NACHTSCHWALBE

Un migrateur le 7.10 à Derborence/Conthey, 1450 m! (F. Klotzli).

ALOUETTE LULU, HEIDELERCH

Passage conséquent noté entre le 4.10 à Chamoson et le 5.11 à Martigny, où nous relevons des groupes d'au moins 23 ind le 30.10 et de 21 ind le 2.11 (beP).

HIRONDELLE DE ROCHERS, FELSENSCHWALBE

En plaine, 4 dernières le 25.10 à Rarogne (Sal); toute dernière un jour plus tard au col de Bretolet (cyS).

HIRONDELLE RUSTIQUE, RAUSCHSCHWALBE

Dernière très attardée le 22.11 à Branson/Fully (mPe).

PIPET ROUSSELIN, BRACHPIEPER

2 ind le 22.8 à Martigny (hDu, J. Duplain).

ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE

L'espèce est vue en déplacement erratique post-nidification, le 20.8 sur Zermatt, 4000m! (mTh).

TARIER DES PRÉS, BRAUNKEHLCHEN

Dernières observations le 11.10, avec 2 ind à Collombey-Muraz et 3 à Vouvry (rV).

TARIER PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN

Encore 2 le 23.11 à Loèche (Sal).

TRAQUET MOTTEUX, STEINSCHMÄTZER

Observé en plaine du 27.8 à Vionnaz (rV) au 25.10 à Rarogne (Sal).

MERLE À PLASTRON, RINGAMSEL

Ultime ind le 20.10 dans la région siéroise (Rey).

GRIVE MAUVIS, ROTDROSSEL

A Martigny uniquement, une le 8.11 et cris entendus le 17.11 (beP).

LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDSCWIRL

Une seule mention hors col de Bretolet, le 16.8 à Martigny (beP).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE, TEICHROHRSÄNGER

2 dernières le 30.9 à Grône (Rey).

POUILLOT FITIS, FITIS

Dernier le 18.9 sur Zermatt, 2250m (moJ, jS).

GOBEMOUCHE À COLLIER, HALSBANDSCHNÄPPER

Une f juv capturée le 13.8 au col de Bretolet (L. Cueni, M. Schaad, cyS; CAVS).

GOBEMOUCHE NOIR, TRAUSERSCHNÄPPER

Dernier migrateur le 1.10 sur Zermatt, 2000m (moJ, jS).

RÉMIZ PENDULINE, BEUTELMEISE

2 ind en erratisme estival le 16.8 à Martigny, où l'espèce est encore vue à 4 reprises entre le 29.9 et le 8.11; à noter une quinzaine d'ind le 13.10 dans un champ de maïs (cId, beP).

PIE-GRÈCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER


Une f très tardive à Martigny les 10 et 13.11! (beP; CAVS).

PIE-GRÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER

Une migratrice, dont l'appartenance à la race *meridionalis* n'a pu être confirmée, est vue le 8.10 à Trient, 1350m (aLu). Début d'hivernage à Tourtemagne, où un ind est signalé à partir du 15.11 (mGe, beP, Rey, Sal), et vraisemblablement aussi à Rarogne (1 ind le 23.11; Sal).

PIE, ELSTER

6 ind en erratisme automnal le 22.9 à Berroi/Champéry, 1840m, où l'espèce est revue le 4.10 (jcT).



Bec-croisé, Fichtenkreuzschnabel.

DESSIN JÉRÔME FOURNIER.

CASSENOIX MOUCHETÉ, TANNENHÄHER

Du 4.8 au 29.11, 1 à 5 ind viennent chaque matin aux noisettes sur Monthey, 500m (rV); également observé en plaine à Martigny le 17.8 (beP), à Viège le 30.8 (aSi) et à Sierre le 10.9 (jeF); à l'inverse, 16 ind le 14.8 à 3030m sur Zermatt (jS). Au col de Bretolet, le total automnal de 58 captures (contre une moyenne de 17,6 pour les 8 années précédentes) exprime à sa manière les mouvements constatés à l'échelle nationale. (Illustration p. 53).

CHOUCAS, DOHLE

Une trentaine le 6.10 au col de Bretolet (anonyme, par cyS), puis une dizaine le 26.10 à Dorénaz (eRe), des cris entendus le 30.10 à Martigny (beP) et 4 ind le 1.11 à Loèche (Sal).

CORBEAU FREUX, SAATKRÄHE

Apparition insolite d'un groupe de 210 ind essentiellement constitué de juv le 28.8 à Collombey-Muraz (rV), puis normalement dès le 30.10 à Martigny (150 ind; beP) et le 31.10 à Vionnaz (50 ind; rV) et jusqu'au 29.11 à Vouvry (250 ind; rV). A noter que, du 18.10 au 4.12, 20 à 86 ind en provenance du val d'Illeliez gagnent Monthey chaque matin (rV).

MOINEAU DOMESTIQUE, HAUSSPERLING

3 ind le 5.9 à Aletsch, 2060m, aux alentours d'un restaurant (beP).

NIVEROLLE, SCHNEEFINK

Entre autres, un groupe de 50 ind le 27.7 sur Zermatt, 2800 m (JoD).

BEC-CROISÉ, FICHTENKREUZSCHNABEL

Entre le 6.9 et le 28.9, 2 à 36 ind vus sur les hauts de Monthey, 500 m (rV); ces visites régulières à basse altitude peuvent sans doute être considérées comme un écho de l'invasion estivale et automnale constatée sur l'ensemble du Plateau suisse. (Illustration p.54)

BRUANT FOU, ZIPPAMMER

A noter un ind le 16.9 sur La Fouly/Orsières, 2100m (aSi).

BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN

Derniers les 14-15.9 à Trient, 1370 m (cID, rLu, beP, eRe, aSi), et le 21.9 sur l'arête de Berroi/Champéry (rlm, beP).

ESPÈCES EXOTIQUES EXOTISCHE ARTEN

CANARD MANDARIN, MANDARINENTE

A Sierre, 1 ind du 3.2 au 5.3 (Rey).

Erratum & Addendum

Printemps-été 1996

Ajouter:

CISTICOLE DES JONCS, CISTENSÄNGER:

1 m ch le 18.7 à Loèche (J. & U. Zettel et al; CAVS).

Indices de nidification 1996

ROSELIN, KARMINGIMPEL

Le commentaire concernant le Roselin dans le Chablais doit être corrigé en biffant la proposition «où il a même niché». Vérification faite, les preuves sont insuffisantes pour l'affirmer. Par ailleurs, le premier indice sérieux de nidification pour le canton a été apporté le 12.6.1994 à Münster par la découverte d'un nid en construction avancée (U. N. Glutz von Blotzheim *in litt.*).

GYGNE TUBERCULÉ, HÖCKERSCHWAN

La nidification signalée à Morgins/Troistorrent, 1360 m, est une «farce»: tous les oiseaux qui ont grandi sur ce lac sont nés au Bouveret, puis ont été transportés, avec leurs parents, en véhicule automobile, jusqu'à cette station. (R. VOISIN *in Litt.*)

BIBLIOGRAPHIE

Complétée des publications récentes touchant à l'ornithologie valaisanne.

- BARBALAT, A. 1998. Recensements des oiseaux d'eau en Suisse romande: novembre 1996 et janvier 1997. *Nos Oiseaux* 45: 157-162.
- DIDELOT-VICARI, Cl. & Th. SCHMID. 1998. Chronique ornithologique romande: le printemps et la nidification en 1996. *Nos Oiseaux* 45: 35-54.
- GUÉX, Cl. 1997. Informations: A propos de la réintroduction du Gypaète barbu dans les Alpes. *Nos Oiseaux* 44: 252.
- KÉRY, M. & B. POSSE. 1998. Auftreten des Schlangenadlers *Circaetus gallicus* in der Schweiz von 1900 bis 1993. *Ornithol. Beob.* 95: 39-54.
- KNAUS, P. & L. MAUMARY. 1998. Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 1996. *Nos Oiseaux* 45: 91-105.
- MAUMARY, L. 1998. Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 1997. *Nos Oiseaux* 45: 209-226.

- MOSIMANN-KAMPE, P., H. HALLER & R. ARLETTAZ. 1998. Verbreitung und Bestand des Uhus *Bubo bubo* in der Schweiz. *Ornithol. Beob.* 95: 143-151.
- POSSE, B. 1997. Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1995-1996 à l'automne 1996. *Bull. Murithienne* 115: 76-90.
- POSSE, B. 1998. Chronique ornithologique romande: l'automne 1996 et l'hiver 1996-1997. *Nos Oiseaux* 45: 135-156.
- SERMET, E. & B. POSSE. 1998. Nidification de la Fauvette passerinette *Sylvia cantillans* aux Follatères/Fully, Valais. Synthèse des observations en Suisse. *Nos Oiseaux* 45: 227-236.
- VOLET, B. & H. LEUZINGER. 1998. Aussergewöhnliche Ansammlungen von Kiebitz *Vanellus vanellus* und Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria* in der Schweiz während der Heimzugperiode 1996. *Ornithol. Beob.* 95: 137-142.



